



Medicatiestaking bij longfunctietest

In overleg met uw huisarts heeft u besloten om binnenkort een longfunctietest te ondergaan. Om deze longfunctietest goed te kunnen uitvoeren, kan het zijn dat u voorafgaand aan de test moet stoppen met het innemen van bepaalde long- en/of allergiemedicijnen. In deze folder leest u meer over het stoppen van uw medicatie.

zekerweten

diagnostiek@rijnstate



Uw huisarts heeft met u besproken welke medicijnen u gebruikt. In onderstaand overzicht ziet u welke van deze medicijnen u moet stoppen voorafgaand aan de longfunctietest. Ook ziet u hoeveel dagen of uren voor de test u deze medicijnen niet meer moet innemen.

Belangrijk: het kan zijn dat u op verzoek van uw arts bepaalde medicatie moet blijven gebruiken. Mocht dit zo zijn, vermeldt dit dan bij aanvang van het onderzoek!

Longmedicatie

6 uur van te voren stoppen:

Merknaam	Generieke naam
Airomir	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Ventonil	Salbutamol

12 uur van te voren stoppen

Merknaam	Generieke naam
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Fenoterol + Ipratropium
Combivent	Salbutamol + Ipratropium

36 uur van te voren stoppen

Merknaam	Generieke naam
AirFluSal Forspiro	Salmeterol + Fluticason
Aerivo	Salmeterol + Fluticason
Atimos	Formoterol
Bufoleer Easyhaler	Formoterol + Budesonide
Busalair	Salmeterol + Budesonide
Duaklir Genuair	Aclidinium + Formoterol
DuoResp Spiromax	Formoterol + Budesonide
Elpenhaler	Salmeterol + Fluticason
Eklira Genuair	Aclidinium
Flutiform	Formoterol + Fluticason
Foradil	Formoterol

Foster	Formoterol + Beclometason
Oxis	Formoterol
Semprex	Acrivastine
Seretide	Salmeterol + Fluticason
Serevent	Salmeterol
Symbicort	Formoterol + Budesonide
Singulair	Montelukast

48 uur van te voren stoppen

Merknaam	Generieke naam
Daxas	Roflumilast Actieve metaboliet
Onbrez	Indacaterol
Relvar Ellipta	Fluticasonfuroaat + Vilanterol
Striverdi	Olodaterol
Theolair Retard	Theofylline
Unilair	Theofylline

168 uur (één week) van te voren stoppen

Merknaam	Generieke naam
Anoro	Umeclidinium/vilanterol
Incruse Ellipta	Umeclidinium
Seebri	Glycopyrronium
Spiriva	Tiotropium
Spiolto	Tiotropium/ Olodaterol
Tiotrus Zonda	Tiotropium
Xoterna	Indacaterol/ Glycopyrronium
Ultibro	Indacaterol/ Glycopyrronium
Trimbow	beclometasondipropionaat/ formoterolfumaraatdihydraat/ glycopyrronium
Relegy	Fluticason/vilanterol/umeclidinium

Het is **niet nodig** om te stoppen met

Merknaam	Generieke naam
Qvar	Beclometason
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Alvesco	Ciclesonide

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met ZekerWeten, polikliniek Longgeneeskunde van Rijnstate Arnhem, telefoonnummer 088 - 005 7790.

Welkom bij ZekerWeten

Soms vindt een huisarts het nodig om in het belang van uw gezondheid verder diagnostisch onderzoek te laten doen. Diagnostisch onderzoek kan vaak meer zekerheid geven en/of bepaalde ziektebeelden uitsluiten. Voorbeelden van diagnostiek zijn bloedonderzoek, röntgenfoto's, onderzoek van weefsel (zoals van een weggenomen moedervlek) of een hartfilmpje.

U mag zelf kiezen waar en door wie u diagnostisch onderzoek laat uitvoeren. Kiest u voor ZekerWeten, dan gaat u voor snelheid en gemak maar bovenal voor de beste diagnostische expertise. Omdat we verbonden zijn met Rijnstate profiteert u direct van de expertise van de medisch specialisten van het ziekenhuis. Bovendien kunt u hierdoor rekenen op de inzet van de beste apparatuur en meetinstrumenten.

ZekerWeten

Postbus 9555
6800 TA Arnhem
088 - 005 5126

info@zekerweten.nl
www.zekerweten.nl

 @zekerwetenvooru